

GATTON PANIC	5
EL CHACO HACIA UNA GANADERÍA PUJANTE	
USTED SABE O CREE QUE SABE	10













Analiza los
eventos que se
suceden en el
año (tacto,
parición, etc.),
para obtener
resultados y
Conclusiones
parciales de
producción, que
permitan corregir
errores de
manejo, antes de
la llegada al
próximo tacto.



Hacía una Ganadería de precisión Visite <u>www.evernet.com.ar</u> e ingrese al DEMO Consultas: 011 15 32762189

Para solicitar una demostración online, comuníquese a evernet@evernet.com.ar o llame al 011 1532762189 / 0114468-0763

## **GATTON PANIC**

Es una gramínea perenne subtropical, que crece en suelos sueltos, con un régimen de lluvias entre los 500-1400 mm anuales. Su ciclo es primavero- estivo otoñal, deteniéndose su crecimeinto en el invierno.

La primavera es la mejor época para su siembra y su densidad es de 5 a 7 kg/ha.

No es aconsejable pastorearlo en forma intensiva, en su primer año, para permitirle el desarrollo de un buen sistema radicular y el primer pastoreo debe realizarse luego de la semillazón para asegurar la resiembra y evitar la muerte de plántulas.

En cuanto a suelo demanda suelos con buena fertilidad. y puede alcanzar producción entre 6.000 y 9.000 kg de materia seca por hectárea año, según la fertilidad disponible y el nivel de lluvias.

Responde muy bien a la fertilización nitrogenada y ofrece un forraje de buena calidad (más del 10% de proteína y 60% de disgestibilidad) a partir de su rebrote primaveral. Tiene una marcada estacionalidad entre los meses de diciembre y febrero. Con cortes de a 30 días se pueden obtener aumentos de peso elevados.

Hay que trabajar con altas cargas para evitar el encañado y pastorearla antes de la floración.

Cuando se lo difiere su calidad es baja. Por lo tanto los rollos se los debe confeccionar cuando la planta tiene más hojas que tallos. Admite cargas entre 2-2,5 EV/ha/año con ganancias de 0,7 kg/cab/día.





## Tilmigen 300

Control y eficacia en una sola dosis.



www.generarlab.com.ar

## EL CHACO HACIA UNA GANADERÍA PUJANTE

Tomando los últimos 6 años, el stock de vacas de la provincia del Chaco se mantuvo en alrededor de 1.000.000 de cabezas, de las cuales se destetaron aproximadamente 540.000 terneros anuales, es decir 54% de destete, lo cual es muy bajo.

Después de saltear los trámites que debe realizar el productor para poder desmontar una hectárea de campo, una vez logrado, esos campos tienen un gran potencial de producción ganadera.

Con la implantación, entre otras especies, de Gatton Panic, Grama Rhodes, Bracharia, Melilotus y alfalfa, se puede armar un plan forrajero que permite lograr altas ganancias de peso y altas producciones de pasto y carne.

Todavía los productores pequeños deben adoptar normas de manejo básicas como el estacionamiento del servicio, realizar tacto, y revisación de toros.

Para los más avanzados deberían adoptar la determinación de la condición corporal como herramienta para manejar la alimentación de los rodeos a lo largo del año, el destete precoz como herramienta para asegurar la recupèración de la condición corporal de la vaca antes del servicio. La incorporación de la inseminación artificial como herramienta para lograr un avance más acelerado del mejoramiento genético de los rodeos. Trabajar en la suplementación proteica para las forrajeras diferidas en el invierno. Confección de silos de maíz o sorgo, rollos de alfalfa o pasturas como reserva forrajera para el cubrir el bache de invierno. Trabajar más en el control sanitario, realizando calendarios sanitarios y cumplrlos. Valorar más el trabajo profesional del veterinario e ingeniero y realizar mucha Capacitación.

Es decir el productor chaqueño tiene un largo camino por recorrer, en una provincia con un gran potencial de producción. Lo que tiene que tener cuidado como dice el Martín Fierro, que por quedarse dormido, y no ver lo que tiene debajo de los pies, "lo deboren los de afuera".





## **USTED SABE O CREE QUE SABE**

A continuación los desafio a contestar estas 10 preguntas:

Para los que contesten las 10 preguntas bien, les regalo un abono por un semestre del **Soft Ganadero** para el **"Manejo de un rodeo de cría"**. Para ver de que se trata, visiten **www.evernet.com.ar** 

Para participar solo tienen que contestar las preguntas y luego enviármelas por mail a **evernet@evernet.com.ar** que yo se las corrijo y se las reenvío con el resultado. Tienen todo el mes de diciembre para contestar.

Que tengan mucha suerte!!!

- 1) Para que sirve realizarle el tacto a las vacas con servicio?
- 2) A los cuántos meses conviene, una vez terminado el servicio, realizar el tacto?
- 3) Qué condición corporal debe tener la vaca en el tacto? ¿Porqué?
- 4) Cuál es el objetivo de tener el servicio estacionado?
- 5) A partir de qué mes produce aborto la brucelosis?
- 6) Cuál es el ciclo de producción de pasto de las especies subtropicales?
- 7) Nombre dos especies de pasturas subtropicales?
- 8) Nombre dos especies de pasturas templadas?
- 9) Las terneras recría, a qué edad llegan a la pubertad?
- 10) A qué edad y con qué desgaste de dentadura considera usted una vaca CUT?

Si no las saben no se desanimen, investiguen, o pregunten. Vamos no pierden nada. Si lo hacen GANAN !!!!



